


Régimen pluvial oceánico: hidrograma del Miño en Puente Mayor

El régimen del río Miño presenta una marcada estacionalidad que se relaciona con la distribución de las lluvias a lo largo del año. El máximo se produce en invierno, momento durante el cual los suelos están saturados por las abundantes precipitaciones, mientras que el mínimo es estival, como consecuencia de la disminución de las lluvias y de las mayores pérdidas por evaporación, o por el aumento de la demanda de agua por parte de los seres vivos.

RÍO MIÑO, EN FUENTE MAYOR.

	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Σ/12	Mr
m³/s	109	253	446	544	501	501	377	235	147	74	55	64	275,5	21,31
k	0,39	0,92	1,62	1,93	1,82	1,82	1,37	0,85	0,53	0,26	0,20	0,23		

Cuenca = 12.926 km²



m³/s	Caudal medio mensual
k	Relación entre el caudal medio mensual y el módulo o caudal absoluto
Σ/12	Módulo o caudal absoluto que es la suma de los caudales medios mensuales dividida entre los doce meses del año.
Mr	Módulo o caudal relativo es la relación que existe entre el módulo absoluto multiplicado por mil y la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados.